

¿CÓ-
MO
ABOR-
TAR
CON
PASTI-
LLAS?



Cartilla descargable
de la línea aborto libre

infoabortochile.org



© **¿Cómo abortar con pastillas?** Cartilla descargable de la línea aborto libre.

Colección: Estrategias feministas frente al aborto clandestino.

Contenidos: Comité editorial Dejemos la escoba.

Ilustradoras: Ro, Angela, Juana y Colífor.

Diseño Gráfico: Felipe Román Osorio.

Primera edición, Santiago-Valparaíso, Chile. Verano 2016.

Obra protegida con una licencia libre creative commons.



femilesinfo@gmail.com
www.infoabortochile.org

¿CÓMO ABORTAR CON PASTILLAS?

Se sugiere estar acompañada de **OTRAS MUJERES** que te ayuden a Monitorear tus síntomas y que te ayuden a que te sientas cómoda. Siempre **EL AMOR ENTRE MUJERES** es un buen analgésico

Es un Método que nace desde **NOSOTRAS: MUJERES QUE NO QUEREMOS PARIR** y que **HOY** está avalado por la OMS y comprobado por muchas mujeres en todo el mundo.

PERMITE que **ABORTEMOS** de forma **AUTÓNOMA Y SIN RIESGOS**, sin MédicXs Lucrando e **INTERVINIENDO** nuestros cuerpos

El riesgo de complicaciones **ES MUY BAJO**: 3% a un 9% de las mujeres requieren hospitalización.

ES MUY EFECTIVO: en un 97%- 94% de las mujeres que lo utilizan, se induce el aborto

Hacer siempre una Eco antes y después de 15 días de finalizado el Procedimiento.

*** NUNCA SE DEBEN TOMAR PASTILLAS PARA EL DOLOR MENSTRUAL NI TAMPOCO PASTILLAS PARA LOS CÓLICOS PORQUE REDUCEN LAS CONTRACCIONES EN EL ÚTERO Y PUEDEN CONTRARRESTAR EL EFECTO DEL MEDICAMENTO.**

¿CÓMO ABORTAR CON PASTILLAS?

MÉTODO CON MISOPROSTOL + MIFEPRISTONA

La mujer toma
2 medicamentos:

1. MIFEPRISTONA: bloquea el acceso de la progesterona, una hormona que se necesita para mantener el embarazo.
DOSIS: 200 mg en TOTAL.

2. MISOPROSTOL: se utiliza 24 horas después, y provoca cambios en el cuello uterino y contracciones del útero, expulsando sus contenidos.
Acorta-Centra y Pone Blando el cuello uterino

DOSIS: 6 comprimidos sublinguales (200 mcg cada comprimido).



> **Forma de uso:**

> **Paso 1: TRAGAR 200 mg de MIFE 24 horas antes del procedimiento.**

> **Paso 2: 24 horas después**
Pongo 4 tabletas de Misoprostol bajo mi lengua durante 30 minutos. Lo que queda lo escupo, lo trago o lo dejo.

(ESPERO 3 HORAS)

> **Paso 3:** Pongo 2 tabletas de Misoprostol bajo mi lengua durante 30 minutos. Lo que queda lo escupo, lo trago o me lo quedo.
(ESPERO 3 HORAS o sea REPITO el paso 1)

> **Paso 4: SOS Sólo si no ha pasado NADA (ausencia de sangrado) aplico 2 tabletas de MISO debajo de mi lengua.**

¿CÓMO ABORTAR CON PASTILLAS?

MÉTODO SÓLO CON MISOPROSTOL

Método eficaz hasta las 12 semanas de embarazo. Dosis total 12 pastillas de Miso, 200 mcg cada una (2,400 mcg en Total)


Paso 1: Pongo 4 tabletas de Misoprostol bajo mi lengua durante 30 minutos. Lo que queda lo escupo, lo trago o lo dejo. (ESPERO 3 HORAS)

Paso 2: Pongo 4 tabletas de Misoprostol bajo mi lengua durante 30 minutos. Lo que queda lo escupo, lo trago o me lo quedo. (ESPERO 3 HORAS o sea REPITO el paso 1)

Paso 3: Una vez más pongo 4 tabletas de Misoprostol bajo mi lengua nuevamente durante 30 minutos MÍNIMO.

Lo que sucederá es un sangrado **TIPO menstruación** un poco + abundante y es posible sentir calambres, escalofríos, temperatura y náuseas.

Si el sangrado es excesivo (2 toallas higiénicas X más de 1 hra.) y si tienes más de 39° de fiebre, debes concurrir a un Centro Médico con la **SEGURIDAD de que FUE un ABORTO ESPONTÁNEO**, porque no quedan rastro de MISO en el Útero, tampoco hay examen de sangre para verificarloooooo!!!



SÍNTOMAS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO



Lo que sucederá es un sangrado **TIPO menstruación** un poco + abundante y es posible sentir calambres, escalofríos, temperatura y náuseas.

PUEDE venir con coágulos y tejidos. El color y el olor del sangrado deben ser iguales a los de una menstruación.

Para esto pueden tomar Ibuprofeno de 400 mg. con intervalos de 6 u 8 horas, hasta que pase el dolor.

Diarrea, vómitos y malestar estomacal (la diarrea es el más común). Para esto pueden tomar aguas de hierbas, **utilizar un cojín de semillas tibio o un guatero.**

Escalofríos y elevación de la temperatura corporal (FIEBRE durante El procedimiento)

SÍNTOMAS DE COMPLICACIÓN

Si el sangrado es excesivo (2 toallas higiénicas X más de 1 hora.) y si tienes más de 39° de fiebre, debes concurrir a un Centro Médico con la **SEGURIDAD de que FUE un ABORTO ESPONTÁNEO**, porque no quedan rastro de MISO en el Útero, tampoco hay examen de sangre para verificarloooooo!!!



NADIE puede obligarte a entregar información sobre lo que provocó tu sangrado, y **DEBEN** atenderte como **CUALQUIER** otra emergencia médica...



EDITORIAL DEJEMOS LA ESCOBA

> **Línea Aborto Chile: El Manual**

¿Cómo las mujeres pueden hacerse un aborto con pastillas?

> **Proyecto Verde Flúor.** El incendio de la realidad consensuada. Un conjuro de feminismo radical y brujería práctica.

> **Jane:** Documentos del servicio clandestino de aborto de Chicago (1968-1973).

Lesbianas y Feministas
Línea Aborto Libre

infoabortochile.org
9 7 5 3 0 7 4 6 1



Circuito feminista
Salud sexual y aborto seguro

9 7 5 3 0 7 4 6 1